

Quan no hauria d'assistir un alumne al centre? (basat en les *Recomanacions de no-assistència a centres educatius per processos infecciosos i risc de contagi* publicades per la Conselleria d'Educació i la Conselleria de Salut i Consum (2019) (actualitzat pel covid-19).

Un alumne o alumna NO HAURIA D'ASSISTIR al centre escolar o la família hauria d'acudir a cercar-lo si presenta algun d'aquests signes:

- febre (temperatura axil·lar $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$)
- dificultat respiratòria
- diarrea
- vòmits
- erupcions a la pell, amb febre, fins que el metge determini si la causa és infecciosa o no ho és
- lesions bucal o nafres disseminades a la boca, associades a la incapacitat de l'infant de controlar la salivació, que n'afecten l'estat general (excepte si el metge determina que la malaltia no és infecciosa) i/o no li permeten ingerir de manera adequada
- conjuntivitis purulenta: pus o exsudat seropurulent als ulls, acompanyat amb ull vermell o enrogiment de la parpella o de la pell que els envolta

Un alumne o alumna NO HAURIA D'ASSISTIR al centre educatiu si pateix alguna d'aquestes afeccions:

Malaltia	Període de no-assistència recomanat
Malalties respiratòries	
Bronquiolitis per VRS	Fins que deixi de tenir febre i dificultat respiratòria
Grip	Fins que deixi de tenir febre i n'hagi millorat l'estat general
Tos ferina	5 dies després de l'inici del tractament
	21 dies després si no s'ha tractat
Tuberculosi	Fins que el metge o l'autoritat sanitària ho autoritzi
Covid-19	Fins que el metge o l'autoritat sanitària ho autoritzi
Malalties gastrointestinals	
Gastroenteritis	24 hores després de la darrera diarrea o del darrer vòmit
	En alguns casos (gastroenteritis per salmonel·la Paratyphi, E. coli de tipus hemorràgic, shigel·les...) no ha d'acudir al centre educatiu fins que el pediatre ho indiqui.
Malalties de la pell o de les mucoses	
Conjuntivitis purulenta	Fins que no presenti secreció purulenta
Escarlatina	24 hores després d'haver iniciat el tractament antibiòtic
Impetigen	Fins que es curin les lesions o 48 hores després d'haver iniciat el tractament antibiòtic Cal tapar les lesions que estiguin en zones exposades
Rubèola, xarampió, galteres	5 dies després de l'inici de les taques En el cas de les galteres, 5 dies després de la inflamació de les glàndules
Sarna	Després d'iniciar el tractament Cal tapar les lesions que estiguin en zones exposades
Varicel·la	5 dies després de l'inici de les lesions Cal tapar totes les lesions que siguin crosteres
Altres malalties	
Hepatitis A	Fins a 7 dies després que se n'hagin iniciat els símptomes
Meningitis bacteriana	Fins que no s'hagi recuperat del tot
Meningitis vírica	Fins que no s'hagi recuperat del tot